

V Brně dne
27.10.2021

Poučení o riziku odmítnutí hospitalizace v případě závažných projevů nemoci COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2, který byl diagnostikován metodou RT-PCR

Vystaveno pro:

Mgr. Vendula Zahumenská, PhD., rč: 8 1 6 2 2 8 / . . .

Z důvodu svědomí klientka odmítá hospitalizaci v případě infekce koronavirem SARS-CoV-2 potvrzeným metodou RT-PCR.

Klientka je rozhodnuta, že pokud by u ní došlo k projevům nemoci COVID-19 potvrzené pozitivním testem RT-PCR, podrobí se za všech okolností jen ambulantní léčbě a nebude hospitalizována.

Byly podány informace, že v případě zhoršení zdravotního stavu v důsledku infekce koronavirem nelze v ambulantní péči řešit následující situace a lze s velmi vysokou pravděpodobností předpokládat úmrtí:

- a) Vznik plicního zánětu podmiňující respirační selhání. Při tomto stavu dochází k těžké poruše okysličování krve a vylučování CO₂. Výsledkem je metabolický rozvrat. Následný stav není slučitelný se životem.
- b) Rozvoj tromboembolické nemoci. To znamená vznik krevní sraženiny, která může výrazným způsobem poškodit funkci především plic, srdce, mozku nebo ledvin. Poškození výše uvedených orgánů může být smrtelné.

Vysvětleno, že účinnou léčbu snižující riziko smrti nelze řádně zajistit ambulantně bez pobytu v nemocnici. Lze předpokládat použití následující léčby v průběhu hospitalizace:

- 1) Podpora dýchání s využitím oxygenoterapie s vysokým průtokem kyslíku, invazivní nebo invazivní podpůrné ventilace.
- 2) Nutnost trvalé monitorace (sledování) základních životních funkcí jako srdeční činnost, krevní tlak a laboratorní parametry vnitřního prostředí.
- 3) Žilní aplikaci trombolitik a podávání protisrážlivých preparátů s nutností intenzivního sledování laboratorních hodnot.
- 4) Situace dále může vyžadovat další podpůrnou léčbu podávanou nitrožilním způsobem jako antibiotika, protizánětlivé léky (kortikoidy) a nitrožilní roztoky upravující vnitřní prostředí.

I přes výše uvedené klientka trvá na svém rozhodnutí odmítnout hospitalizaci, pokud by u ní došlo k závažnému zhoršení klinického stavu. Akceptuje, že za dané situace by byly využity jen takové léčebné metody, které lze řádně aplikovat ambulantním způsobem.